

Základní informace k projektu VZP

3. DÁVKA ZDARMA

INFORMACE O PROJEKTU

- projekt bude určen pro pojištěnce VZP
- projekt je určen pouze pro ženy a dívky ve věku **10 - 25 let** včetně
- projekt bude časově i objemově omezen
- celková výše platby za očkování bude max. **6 400,- Kč**

CERTIFIKÁT

- v období od **17. 5. 2010** bude možné na pobočce VZP vyzvednout certifikát k projektu
- certifikát bude složen ze dvou částí:
 - do jedné lékař zaznamenává aplikace a platby vakcíny (musí být zaznamenáno datum aplikace první dávky, u druhé a třetí dávky postačuje zaznamenání platby dávek)
 - druhou část odevzdává lékař distributorovi a na základě jejího předložení obdrží dávku vakcíny za sníženou cenu

Jedním z partnerů projektu je MSD.



© Registrovaná ochranná známka Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.
© Copyright Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Všechna práva vyhrazena.
MERCK SHARP & DOHME IDEA, Inc., org. sl.*, Křenova 5, 162 00 Praha 6, Tel.: +420 233 010 111, www.msdi.cz
*Affiliate of Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.



Vakcína proti lidskému papilomaviru
[typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná)

- projekt garantuje pojištěnkyním VZP maximální platbu **6 400,- Kč**
 - max. 3 200,- Kč za první a druhou dávku
 - 1 000,- Kč za třetí dávku
- příspěvek VZP 1 000,- Kč
 - příspěvek bude vyplacen po předložení vyplněného certifikátu a platebních dokladů na pobočce VZP
 - v certifikátu musí být zaznamenána aplikace první dávky a platba za druhou a třetí dávku
- platby neobsahují aplikační poplatky, tato informace bude uvedena na certifikátu

INFORMACE O PROJEKTU

- certifikáty budou dostupné na pobočkách VZP **od 17. května 2010**
- první dávku bude nutné aplikovat nejpozději **do 30. června 2010**
- příspěvek VZP bude vyplacen nejpozději 31. prosince 2010
- příspěvek VZP bude moci být vyplacen již v případě potvrzení aplikace první dávky a potvrzení platby druhé a třetí dávky

DOPORUČENÝ POSTUP

- kontaktování pacientek, pro něž je projekt vhodný, tzn:
 - jsou pojištěnkyně VZP
 - splňují věkový limit 10 - 25 let (u obou věkových hranic včetně)
- vyzvednutí certifikátů na pobočce VZP
- aplikace první dávky vakcíny co nejdříve. V případě aplikace první dávky vakcíny SILGARD® **do 30. května 2010** lze stihnout aplikaci druhé dávky ještě do prázdnin (do začátku července) - v takovém případě bude také možné čerpat ihned příspěvek VZP (za předpokladu splnění všech podmínek).
- Přípravek SILGARD® je vakcína určená k prevenci:
 - premaligních genitálních lézí (cervikálních, vulválních a vaginálních),
 - cervikálního karcinomu a
 - bradavic zevního genitálu (condyloma accuminata) v příčinné souvislosti s lidským papilomavirem (HPV) typů 6, 11, 16 a 18.

DALŠÍ INFORMACE

- projekt bude podporován a komunikován v masmédiích
- podrobné informace k projektu budou uvedeny na www.vzp.cz

Zkrácené informace o léčivém přípravku:

Silgard® injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná), (Papilomaviri humani typus 6, 11, 16, 18 proteinum L1)

Indikace: Prevence premaligních genitálních lézí (cervikálních, vulválních a vaginálních), cervikálního karcinomu a bradavic zevního genitálu (condyloma accuminata) v příčinné souvislosti s lidským papilomavirem (HPV) typů 6, 11, 16 a 18. Indikace je založena na prokázané účinnosti u dospělých žen ve věku 16 až 26 let a na prokázané imunogenitě u 9 až 15letých dětí a dospívajících. Použití přípravku Silgard musí být v souladu s oficiálními doporučeními. * **Kontraindikace:** Precitlivělost ke všem komponentám vakcíny, závažné akutní horečnaté onemocnění. **Dávkování:** Základní očkování - 3 samostatné 0,5 ml dávky podané dle následujícího schématu: 0, 2, 6 měsíců. Všechny dávky musí být podány intramuskulárně během jednoletého období. **Upozornění:** Pro případ závažných anafylaktických reakcí musí být k dispozici odpovídající léčebná opatření. Vakcína není určena k léčbě, nenahrazuje rutinní cervikální screening. Jedinci se sníženou imunitní reakcí nemusí na vakcínu zareagovat. Podávat opatrně jedincům s trombocytopenií nebo s jakoukoli poruchou koagulace. **Interakce:** Při současném podání s vakcínou proti hepatitidě typu B (rekombinantní) nedošlo ke klinicky významným změnám v imunitních odpovědích na obě vakcíny. Použití hormonální antikoncepce neovlivnilo imunitní odpověď. **Těhotenství a kojení:** Očkování odložit až na dobu po ukončení těhotenství. Může být podávána kojícím ženám. **Nežádoucí účinky:** Velmi často erytém, bolest a otok v místě injekce, pyrexie, často bolest v končetinách, zimnožloutna, podlitina a pruritus v místě injekce, vzácně kopřivka, velmi vzácně bronchospasmus. **Zkušenosti po uvedení přípravku na trh:** Protože tyto účinky byly hlášeny dobrovolné populaci o neurčité velikosti, není možné spolehlivě odhadnout jejich četnost nebo potvrdit pro všechny účinky kauzální souvislosti s podáním vakcíny. Lymfadenopatie, reakce precitlivělosti včetně anafylaktických / anafylaktoidních reakcí, syndrom Guillain-Barrého, závrat, bolest hlavy, synkopa, nauzea, zvracení, artralgie, myalgie, tělesná slabost, únava, malátnost. * **Léková forma:** Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. **Uchovávání:** V chladničce (2 °C-8 °C), ve vícekrabíčce, chránit před mrazem. **Velikost balení:** 0,5 ml suspenze v předplněné injekční stříkačce se dvěma jehlami - balení po 1 kusu. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Merck Sharp & Dohme Ltd., Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Velká Británie. **Registrační číslo:** EU/1/06/358/003-021. **Poslední revize textu SPC:** 2/9/2009

* Všímněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.

Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, s úplným souhrnem údajů o přípravku. Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

