

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA

Informace pro použití, čtěte pozorně!

MODURETIC[®]

tablety
(amiloridi hydrochloridum dihydricum, hydrochlorothiazidum)

Co je to MODURETIC?

MODURETIC obsahuje 5 mg amiloridu a 50 mg hydrochlorothiazidu jako léčivé látky.

Kromě toho obsahují tablety MODURETIC následující pomocné látky:
hydrogenfosforečnan vápenatý, monohydrát laktosy, předbobtnalý škrob, kukuřičný škrob, guar galaktomanan, hlinitý lak oranžové žluti, magnesium-stearát

Amiloridová složka přípravku MODURETIC je lékem patřícím do skupiny antikaliuretik (draslík šetřících léků); amilorid je také slabým diuretikem (tableta podporující močení).

Hydrochlorothiazidová složka přípravku MODURETIC je lékem patřícím do skupiny diuretik.

Proč mi lékař předepsal MODURETIC?

Lékař Vám předepsal přípravek MODURETIC s cílem zachovat normální hladiny draslíku v krvi. MODURETIC se používá k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku), otoků (otoky kotníků, chodidel a dolních končetin v důsledku zadržování vody v organismu nebo ascitu (hromadění vody v břišní dutině) v důsledku cirhózy (onemocnění jater).

Jak MODURETIC působí?

Působením přípravku MODURETIC vylučují ledviny více vody a soli a zadržují více draslíku. To pomáhá snižovat vysoký krevní tlak a omezit některé formy otoků, přičemž zároveň pomáhá udržovat normální hladiny draslíku v krvi.

INFORMACE PRO PACIENTY S VYSOKÝM KREVNÍM TLAKEM

Co je krevní tlak?

Krevní tlak je tlak, který vzniká čerpáním krve do všech částí organismu. Bez krevního tlaku by krev v organismu necirkulovala. Normální krevní tlak je součástí zdravého organismu. V závislosti na činnosti, stresu a vzrušení se Váš krevní tlak během dne mění.

Hodnota krevního tlaku sestává ze dvou čísel, například 120/80. První číslo vyjadřuje sílu, s níž srdce krev čerpá. Druhé číslo udává sílu v klidu, mezi jednotlivými srdečními stahy.

Co je vysoký krevní tlak (hypertenze)?

Vysokým krevním tlakem neboli hypertenzí trpíte, pokud hodnota Vašeho krevního tlaku zůstává vysoká, i když jste v klidu acítíte se uvolnění. Krevní tlak se zvyšuje při stažených cévách, kdy jimi krev protéká obtížněji.

Jak se dozvím, že mám vysoký krevní tlak?

Obvykle nelze žádné příznaky (symptomy) vysokého krevního tlaku pozorovat. Jediná možnost, jak zjistit, že trpíte hypertenzí, je znát svůj krevní tlak. Proto byste si měli krevní tlak pravidelně nechat měřit.

Proč se musí vysoký krevní tlak (hypertenze) léčit?

Pokud se vysoký krevní tlak neléčí, může poškodit životně důležité orgány, jako je srdce a ledviny. Můžete se cítit dobře a nemít žádné symptomy, ale v konečném důsledku může hypertenze způsobit cévní mozkovou příhodu (mozkovou mrtvici), srdeční záchvat (infarkt myokardu), srdeční selhání, selhání ledvin nebo slepotu. Vysoký krevní tlak lze léčit a regulovat užíváním léků jako je přípravek MODURETIC.

Lékař Vám řekne, jaká by měla být hodnota Vašeho krevního tlaku. Toto číslo si zapamatujte a dodržujte rady lékaře, jak této cílové hodnoty dosáhnout.

CO JE TŘEBA VĚDĚT PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNU UŽÍVAT MODURETIC?

Kdo nesmí MODURETIC užívat?

Neužívejte přípravek MODURETIC, pokud

- trpíte alergií na kteroukoli složku přípravku (viz bod Co je to MODURETIC?)
- trpíte alergií na jakékoli léky obsahující sulfonamidy (pokud si nejste jisti, co jsou léky obsahující sulfonamidy, zeptejte se svého lékaře)
- máte už přirozeně vysoké hladiny draslíku v krvi
- užíváte už jiné léky nebo suplementy pro zvýšení množství draslíku v krvi
- trpíte onemocněním ledvin

Pokud si nejste jisti, zda byste mohli začít užívat přípravek MODURETIC, poraďte se s ošetřujícím lékařem.

Užívání během těhotenství nebo kojení matkami

Užívání během těhotenství

- Užívání přípravku MODURETIC těhotnými ženami je kontraindikováno.
- Jestliže jste těhotná nebo hodláte otěhotnět, sdělte to svému lékaři ještě před zahájením léčby přípravkem MODURETIC, aby mohl zvolit jiný způsob léčby.

Užívání kojení matkami

- Hydrochlorothiazidová složka přípravku MODURETIC se vyskytuje v mateřském mléku. Pokud kojíte nebo plánujete kojit, poraďte se se svým lékařem.

O čem musím informovat lékaře dříve než začnu užívat přípravek MODURETIC?

Informujte ošetřujícího lékaře s všech zdravotních potíží, které máte nebo jste měli, a o všech alergiích.

Informujte ošetřujícího lékaře, pokud máte přirozeně vysoké hladiny draslíku v krvi, trpíte onemocněním srdce a plic, jater nebo ledvin, máte dnu, lupus erythematodes, nebo pokud se léčíte jiným diuretikem (tabletami podporujícími močení). V těchto případech se ošetřující lékař může

rozhodnout, že Vám dávky léků upraví. Informujte ošetřujícího lékaře, pokud máte diabetes (cukrovku), protože thiazidy si mohou vyžádat úpravu dávek antidiabetik včetně inzulínu.

Před operací nebo navozením anestézie (i u zubaře) informujte lékaře nebo zubaře, že užíváte přípravek MODURETIC, protože anestézie může způsobit náhlý pokles krevního tlaku.

Přípravek MODURETIC obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek MODURETIC obsahuje hlinitý lak oranžové žluti. Může způsobit alergické reakce.

Použití u dětí

Bezpečnost a účinnost přípravku nebyla u dětí stanovena.

Mohu užívat MODURETIC současně s jinými léky?

Obecně platí, že přípravek MODURETIC lze užívat s jinými léky. Je však třeba informovat lékaře o všech dalších lécích, které užíváte, včetně těch, které užíváte bez lékařského předpisu, protože účinky některých léků se mohou navzájem ovlivňovat. Obzvláště je třeba, aby ošetřující lékař věděl, pokud užíváte inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), antagonistu receptorů pro angiotenzin II, jiné draslík šetřící léky nebo draslíkové doplňky. Informujte ošetřujícího lékaře i tehdy, pokud užíváte jiné léky na snížení krevního tlaku, jiná diuretika (tablety podporující močení), pryskyřice snižující vysoké hladiny cholesterolu, léky určené k léčbě diabetu včetně inzulínu, léky podporující uvolnění svalů, presorické aminy jako je adrenalin, steroidy, některé léky proti bolesti a artróze, cyklosporin, takrolimus nebo lithium (lék užívaný k léčbě určitého typu deprese). Protože sedativa, zklidňující prostředky, narkotika, alkohol a analgetika mohou účinek přípravku MODURETIC na snížení krevního tlaku zesilovat, informujte svého lékaře, pokud užíváte kterýkoli z uvedených léků.

Mohu řídit nebo obsluhovat stroje, pokud užívám MODURETIC?

Náhlá snížení krevního tlaku může ovlivnit schopnost pacienta soustředit se a rychle reagovat a tudíž i schopnost řídit motorová vozidla nebo ovládat stroje.

JAK MÁM MODURETIC UŽÍVAT?

O vhodné dávce rozhodne ošetřující lékař na základě Vašeho zdravotního stavu a podle toho, zda užíváte ještě jiné léky.

Tablety se většinou zapíjejí vodou.

Užívejte přípravek MODURETIC každý den, přesně podle pokynů lékaře. Je velmi důležité pokračovat v užívání přípravku MODURETIC tak dlouho, jak Vám ošetřující lékař předepsal. Neužívejte víc tablet než je předepsaná dávka.

Hypertenze

Obvyklá dávka je jedna tableta přípravku MODURETIC užívaná jednou denně nebo v dílčích dávkách.

Otoky

Obvyklá zahajovací dávka je jedna tableta denně.

Cirhóza s ascitem

Obvyklá zahajovací dávka je jedna tableta přípravku MODURETIC užívaná jednou denně.

Jak postupovat v případě předávkování?

V případě předávkování okamžitě vyhledejte ošetřujícího lékaře, aby Vám mohla být rychle poskytnuta lékařská pomoc. Nejpravděpodobnějšími příznaky předávkování by byly pocit opojení nebo závratě v důsledku poklesu krevního tlaku, nadměrná žízeň, zmatenost, změna v objemu vylučované moči a/nebo rychlý srdeční puls.

Jak postupovat při vynechání dávky?

Přípravek MODURETIC byste měli užívat podle předpisu. Pokud byste však vynechali dávku, neberte už žádnou dávku navíc a pokračujte v léčbě podle obvyklého plánu.

Jaké může mít MODURETIC nežádoucí účinky?

Kterýkoli léčivý přípravek může mít nezamýšlené nebo vedlejší účinky, takzvané nežádoucí účinky. Obecně je přípravek MODURETIC dobře snášen. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří bolest hlavy, slabost, nevolnost/nechutenství nebo úplná ztráta chuti k jídlu, vyrážky nebo závratě.

Výjimečně se mohou vyskytnout i další nežádoucí účinky, přičemž některé z nich mohou být závažné. Více informací o nežádoucích účincích Vám poskytne ošetřující lékař nebo lékárník. Oba mají k dispozici úplný seznam nežádoucích účinků.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se ošetřujícího lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Jak dlouho bych měl/a lék uchovávat?

Neužívejte přípravek Moduretic po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro skladování.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Jak bych měl/a MODURETIC uchovávat?

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Blistr uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Velikost balení: 20, 30 nebo 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERCK SHARP & DOHME B.V.

Haarlem

Nizozemsko

Výrobce

FROSST IBERICA S.A.

Via Complutense 140

28805 ALCALA DE HENARES – MADRID

Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
MERCK SHARP & DOHME IDEA, Inc, org. složka
Křenova 5
165 00 Praha 6

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 08/2009